

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Вессел Дуэ Ф

капсулы 250ЛЕ

Альфа Вассерманн С.п.А, Италия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «      » 111011 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Состав</b></p> <p><u>Раствор для внутривенного и внутримышечного введения</u></p> <p>Каждая ампула (2 мл) содержит:</p> <p>Активное вещество: Сулодексид 600 ЛЕ*</p> <p>Неактивные вещества: хлорид натрия, вода для инъекций.</p> <p><u>Капсула</u></p> <p>Каждая капсула содержит:</p> <p>Активное вещество: Сулодексид 250 ЛЕ*</p> <p>Неактивные вещества: лаурилсаркозинат натрия, кремния диоксид коллоидный, триглицериды.</p> <p>Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол, этилпараоксибензоат натрия, пропилпараоксибензоат натрия, диоксид титана (E171), красный оксид железа (E172)</p> <p>*липопротеиновая единица</p>	<p><b>Состав</b></p> <p><u>Раствор для внутривенного и внутримышечного введения</u></p> <p>Каждая ампула (2 мл) содержит:</p> <p>Активное вещество сулодексид 600 ЛЕ*</p> <p>Вспомогательные вещества: хлорид натрия 18 мг, вода для инъекций до 2 мл.</p> <p><u>Капсулы</u></p> <p>Каждая капсула содержит:</p> <p>Активное вещество: Сулодексид 250 ЛЕ*</p> <p>Вспомогательные вещества: лаурилсаркозинат натрия 3.30 мг, кремния диоксид коллоидный 3.0 мг, триглицериды 86.10 мг.</p> <p>Оболочка капсулы: желатин 55.00 мг, глицерол 21.00 мг, этилпарагидроксибензоат натрия 0.24 мг,</p>

## Изменение № 2 к Инструкции ПN012490/01-040408

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Раствор для внутривенного и внутримышечного введения: 600 ЛЕ/2 мл в ампулах: по 5 ампул в каждой из 2-х контурных ячейковых упаковок или 10 ампул в 1 контурной ячейковой упаковке с инструкцией по применению в пачке картонной.</p> <p>Капсулы 250 ЛЕ: по 25 капсул в блистере; 2 блистера с инструкцией по применению в пачке картонной.</p>	<p>пропилпарагидроксибензоат натрия 0.12 мг, диоксид титана (E171) 0.30 мг, красный оксид железа (E172) 0.90 мг.</p> <p>*липопротеиновая единица</p> <p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 600 ЛЕ/2 мл: по 2 мл в ампулы темного стекла с линией надлома; по 5 ампул в каждой из 2-х контурных ячейковых упаковок или 10 ампул в 1 контурной ячейковой упаковке с инструкцией по применению в пачке картонной.</p> <p>Капсулы 250 ЛЕ: по 25 капсул в блистеры из ПВХ/ПВДХ основы и алюминиевой пленки со слоем покрытием прозрачного ПВДХ; по 2 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p>

Менеджер по регуляторным вопросам

  
подпись

Близнюк О.И.

ФИО

